


♂ Tibiæ anticae longiores, leviter curvatae, intus pilis densis, erectis, sat longis ornatae. Tarsi antici articulo primo majore.

♀ Tibiæ anticae rectae, breviores, intus pube brevi, reclinata, vestitae. Articulus primus tarsorum anticorum minimus ⁽¹⁾.



Corynodes Micheli.

Tibias antérieurs du ♂ (fig. de gauche) et de la ♀ (fig. de droite).

Cinq individus ont été recueillis par M. Ch. Michel dans le pays des Galla; un sixième individu a été récolté par feu Maurice Potter. L'espèce se tient sur les fleurs de Carduacées.

ESPÈCE NOUVELLE D'HÉMIPTÈRE DE LA FAMILLE DES PYRRHOCORIDE,
PAR JOANNY MARTIN.

Myrmoplasta Potteri. nov. sp.

♀ long. 7 millimètres à 7 millim. 5; plus grande largeur du prothorax : 1 millim. 75.

Noir, dos de l'abdomen brun rouge; la partie basilaire du prothorax, en dessus et sur les flanes, une tache près du sommet de chaque squamule élytral, trochanter et moitié basilaire des fémurs postérieurs, taches allongées transversalement, latérales, sur chacun des anneaux inférieurs de

⁽¹⁾ La plupart des termes de comparaison qui ont permis de rédiger la description précédente ont été pris dans la collection du Muséum, étudiée partiellement en 1892 par E. Lefèvre, en ce qui concerne les Eumolpides. Nous avons en, en outre, sous les yeux des spécimens authentiques des *C. abyssinica* Jac., *caerulescens* Fairm. et *cribratellus* Fairm., que M. René Oberthür a bien voulu nous communiquer. Les deux dernières espèces n'étaient pas représentées dans nos collections. M. Oberthür a généreusement abandonné un exemplaire de chacune d'elles au Muséum.

l'abdomen, sauf le dernier, jaune pâle. Des poils noirs, plus nombreux sur la tête que sur les autres parties du corps.

Tête convexe, transversale, fortement déclive en avant, en triangle équilatéral vue de face. Antennes noires, plus courtes que le corps. Premier et deuxième articles subégaux; le troisième égal aux trois quarts du précédent; le quatrième, le plus long de tous, cylindrique, presque égal au double de la longueur du troisième. Prothorax aussi long que large dans sa partie étranglée, divisé transversalement en deux portions presque égales: l'antérieure, cordiforme, très finement ponctuée, à côtés latéraux arrondis, réfléchis; la basilaire en trapèze transversal, lisse, à côtés latéraux droits. Hémiélytres squamiformes, ponctués-rugueux, à bords un peu relevés. Abdomen non pétiolé, plus ou moins orbiculaire, à bords latéraux très fortement réfléchis, se recourbant même sur la face dorsale de l'abdomen. Rostre long, grêle, dépassant les hanches postérieures, à premier article plus long que la tête. Orifice odorifique en fente étroite, courte, entourée d'un léger bourrelet. Partie interne des fémurs antérieurs munie de poils. Les taches latérales jaune pâle des deux premiers segments de l'abdomen seulement atteignent les bords de l'abdomen. Elles s'allongent, comme les autres, en une languette étroite, plus ou moins aiguë, n'atteignant pas le milieu de l'abdomen. Sixième segment entier.

♂ Le mâle n'a que 6 millimètres de longueur. Les fémurs antérieurs portent trois épines au côté interne. Les taches jaunes allongées sur les côtés de l'abdomen, en dessous, ne se montrent que sur les deux premiers segments basilaires. Il y a un commencement de tache sur le troisième.

Plusieurs femelles et un seul mâle, récoltés en Abyssinie par M. Maurice Potter et à la mémoire de qui nous dédions ce curieux Hémiptère.

Notre espèce diffère de *M. mira* Gerstäcker par son système de coloration, par son prothorax plus raccourci et par son abdomen non pétiolé.

Le catalogue de Lethierry et Severin (1894) place à la fois le genre *Myrmoplasta* dans la tribu des *Largimæ*, p. 242, et dans celle des *Pyrhocorinæ*, p. 250. C'est dans cette dernière tribu qu'il convient de ranger ce genre remarquable.

UNE ESPÈCE NOUVELLE D'HYMÉNOPTÈRE APPARTENANT
À LA FAMILLE DES TENTHRÉDINIDES,

PAR ROBERT DU BUYSSON.

Les Hyménoptères recueillis par M. Ch. Michel en Abyssinie sont peu nombreux. Il se trouve cependant parmi eux une très belle espèce d'*Hylo toma* Latreille, à laquelle je suis heureux de donner le nom de notre généreux explorateur.